अॅग्रोमेट अॅडवायझरी बुलेटीन

ग्रामिण कृषि मौसम सेवा, ऐएमएफयु, कोल्हापूर

विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, शेंडा पार्क, कोल्हापूर

दूरध्वनी : (०२३१) २६९२४१६ ईमेल: adrkolhapur@rediffmail.com

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला समितीची साप्ताहिक बैठक दि. ०१.१०.२०२६

जिल्हा : कोल्हापूर

मागील आठवड्यातील हवामान (२५.०९.२०२६ ते ०१.१०.२०२६)							हवामान घटक	पुढील पाच दिवसांचा हवामानाचा अंदाज (०२.१०.२०२६ ते ०६.१०.२०२६)				
२५	२६	२७	२८	२९	३०	०१	दिनांक	०२	०३	०४	०५	०६
०.०	०.०	०.०	०.०	०.४	२२.४	२०.२	पाऊस (मिमी)	३	१	०	१	३
३०.४	३०.६	३१.०	३१.६	३३.४	३२.०	३१.८	कमाल तापमान (अं.से.)	३२	३२	३२	३५	३५
२२.५	२२.६	२०.४	२०.६	२३.०	२१.४	२१.२	किमान तापमान (अं.से.)	२२	२३	२३	२३	२३
८	५	५	८	८	८	८	स. ढग स्थिती (आकाश)	३	२	३	३	३
८	५	८	५	८	८	८	दु.					
८२	८३	८५	८८	८४	९६	९४	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९६	९३	९५	९५	९६
६३	६०	५५	४३	५८	५८	५६	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%)	९५	९२	९१	९१	९१
५.५	५.९	४.६	३.२	२.५	२.४	२.१	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	२	५	६	१	२
प.नै.	प.नै.	नै.	आ.	ई.	ई.	प.	स. वाऱ्याची दिशा	वा.	ई.	पू.ई	ई.	प.नै.
नै.	नै.	वा.	नै.	उ.ई	पू.	नै.	दु.					

मागील आठवड्यातील पाऊस (मिमी)	पाऊस ०१.०१.२०२६ पासून आजपर्यंत (मिमी)	पाऊस दिवस ०१.०१.२०२६ पासून आजपर्यंत
४३	८९०.९	६३

हवामान अंदाजावर आधारित कृषी सल्ला

पीक	अवस्था	कृषि विषयक सल्ला
हवामान सारांश		प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या हवामान अंदाजानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये २, ३, ४, ५ व ६ ऑक्टोबर रोजी आकाश अंशत: ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये व जिल्ह्यातील घाट भागात २, ३, ५ व ६ तुरळक ठिकाणी हलक्या स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ६ ऑक्टोबर पर्यंत कमाल तापमान ३२.० ते ३५.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची तसेच किमान तापमान २२.० ते २३.० अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. सकाळची सापेक्ष आद्रता ९५ ते ९६%, दुपारची सापेक्ष आद्रता ९१ ते ९५% तसेच वाऱ्याचा वेग ताशी १ ते ६ किमी या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
विस्तारित श्रेणी अंदाज		विस्तारित श्रेणीच्या अंदाजानुसार मध्य महाराष्ट्रामध्ये दिनांक ४ ते १० ऑक्टोबर दरम्यान पावसाचे प्रमाण सरासरी पेक्षा कमी राहण्याची, कमाल तापमान सरासरी पेक्षा जास्त राहण्याची तसेच किमान तापमान सरासरी दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
हवामान इशारा	०१.१०.२६	कोल्हापूर जिल्ह्यातील घाट भागात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व ताशी ३० ते ४० किमी वेगाच्या वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये तुरळक ठिकाणी मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट व ताशी ३० ते ४० किमी वेगाच्या वाऱ्यासह हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यता आहे.
सामान्य सल्ला		➢ कीटकनाशके व बुरशीनाशकांची फवारणी पावसाची उघडीप पाहून आणि वारा शांत असताना करावी. ➢ खरीप पिकांना तसेच फळे व भाजीपाला पिकांना पाणी देण्यासाठी शक्यतो ठिबक किंवा तुषार सिंचन पद्धतीचा वापर करावा ➢ फळे तसेच भाजीपाला पिकांमध्ये शक्य असल्यास आच्छादनांचा वापर करावा
संदेश		❖ पक्व झालेल्या सोयाबीन, मूग, उडीद व इतर खरीप पिकांची काढणी करावी व काढणी केलेला शेतीमाल त्वरित सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा
भात	फुलोरा ते दाणे भरणे	➢ भात पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार शेतातील पाण्याची पातळी नियंत्रित ठेवावी. भात पीक अधिकतम फुलोरा अवस्थेत असताना शेतात ५ ते १० सें.मी. पाण्याची पातळी राखावी. पाण्याची कमतरता असल्यास जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. ➢ कडा करपा रोगाच्या प्रतीबांधासाठी स्ट्रेप्टोसायक्लीन २ मिलि + कॉपर ऑक्सीक्लोराईड २० ग्रॅम प्रती पंप याप्रमाणात फवारणी करावी ➢ दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असणाऱ्या भात पिकावर लष्करी आळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. नियंत्रणासाठी क्लोरोपायरीफॉस २.५ मिलि+ सायपेरमेथ्रीन ०.५ मिलि प्रती लीटर पाणी या प्रमाणात मिसळून फवारणी करावी
मका	दाणे भरणे	➢ दाणे भरण्याच्या अवस्थेत असताना संरक्षित पाण्याची उपलब्धता करून द्यावी
ऊस	शाकिय वाढ	➢ ऊस पिकामध्ये पाण्याचा ताण पडत असल्यास २ टक्के युरिया किंवा २ टक्के म्युरेट ऑफ पोटॅशची फवारणी करावी. ➢ जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी उसाची खालची पक्व व वाळलेली पाने काढून ती सरीमध्ये आच्छादनासाठी

		वापरावीत. ➢ पाण्याची बचत करण्यासाठी ऊस पिकाला एक आड एक सरी पद्धतीने सिंचन करावे. ➢ सिंचनासाठी पुरेशा पाण्याची खात्री झाल्याशिवाय पूर्वहंगामी ऊस लागवडीची पूर्वतयारी सुरू करू नये. ➢ वाढलेली आर्द्रता आणि कमाल तापमानामुळे काही ठिकाणी ऊस पिकावर लोकरी माव्याचा प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. प्रादुर्भाव दिसताच इमिडाक्लोप्रिड १७.८% एसएल ३ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
सोयाबीन	शेंगा भरणे ते पक्वता	➢ कमाल तापमानामध्ये झालेली वाढ व वाढलेल्या आद्रतेमुळे काही ठिकाणी शेंगेवरील करपा या रोगाचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. प्रादुर्भाव दिसून येताच नियंत्रणासाठी टेब्युकोनॅझोल १०% + सल्फर६५% डब्ल्यु. जी. या बुरशीनाशकाची २५ ग्रॅम प्रती १० लीटर पाणी याप्रमाणात फवारणी करावी ➢ शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत ००.००.५० या विद्राव्य खताची १० ग्रॅम प्रती लीटर पाणी याप्रमाणात फवारणी करावी. ➢ पक्क झालेल्या सोयाबीन पिकाची काढणी करावी व काढणी केलेला शेतीमाल त्वरित सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा
मूग	शेंगा भरणे ते पक्वता	➢ पावसाची शक्यता असल्याने पक्क झालेल्या शेंगांची वेळेत काढणी करावी. काढणी उशिरा केल्यास पक्क झालेल्या शेंगा तडकतात. ➢ काढणी केलेल्या शेती मालाची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.
टोमॅटो	फळधारणा	➢ जोरदार वाऱ्यामुळे टोमॅटो झाडे उन्मळून पडू नयेत म्हणून टोमॅटो झाडांनासहाय्याने रोपांना काठीच्या किंवा बांबूच्या/ आधार द्यावा ➢ काढणी केलेल्या टोमॅटो फळांची त्वरित सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी
पशुधन	वाढीची	➢ जंत निर्मुलन झालेले असल्यास लाळ खुरकत या रोगाच्या प्रतिबंधासाठी तज्ञ पशु वैद्यकांच्या सल्ल्याने लसीकरण करून घ्यावे. ➢ ऑक्टोबर हीट असल्याने सकाळच्या वेळी जनावरे चारावयास सोडावे, दुपारच्या वेळी उन्हामध्ये जनावरे चारावयास सोडणे टाळावे ➢ जमिनीमध्ये पुरेसा ओलावा असल्यास जनावरांसाठी चाऱ्याचे नियोजन करण्याकरिता चाऱ्यासाठी रब्बी ज्वारीची पेरणी करावी. ➢ पाण्याची उपलब्धता असल्यास संकरीत नेपीयर गवतची लागवड करावी. ➢ चाऱ्यासाठीचा मका उपलब्ध असल्यास मुरघास तयार करावा

मेघदूत ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करावे	दामिनी ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी स्कॅन करावे

ठिकाण : कोल्हापूर
दि. : ०१.१०.२०२६

स्वाक्षरीत
प्रमुख अन्वेषक, ग्राकृमौसे, ऐएमएफयु, कोल्हापूर तथा
सहयोगी संशोधन संचालक,
विभागीय कृषि संशोधन केंद्र , कोल्हापूर